Operative Behandlungsmethoden der weiblichen Belastungsinkontinenz

Dr. Franz Roithmeier

Belastungsinkontinenz

Belastungsinkontinenz (Stressinkontinenz) bedeutet unwillkürlicher Harnverlust bei körperlicher Betätigung, beim Husten oder Niesen.

Definitionen

- **Unkomplizierte Belastungsinkontinenz**
 - keine Inkontinenzoperationen in der Vorgeschichte
 - Keine neurologischen Symptome
 - Kein symptomatischer Genitalprolaps
 - Kein Kinderwunsch
- **Komplizierte Belastungsinkontinenz**
 - ein od. mehrere o.g. Kriterien vorhanden
- **OAB wet** (früher Dranginkontinenz)
- **OAB dry** (“Reizblase”)
- **MIK / seltene Formen** (Überlaufinkontinenz, extraurethrale Inkontinenz)

Risikofaktoren

- Bindegewebsschwäche
- Vaginale Geburten
- Höheres Lebensalter
- Übergewicht
- Chronische Lungenerkrankungen
- Obstipation
- ...

Belastungen des Beckenbodens

- In 70 Jahren durchschnittlich
- 153 000 mal Wasserlassen
- 25 550 Stuhlgang
- 2-3 Geburten
- 5000 Geschlechtsverkehr
- dazu Heben und Tragen, Übergewicht, chronische Lungenerkrankungen, Bindegewebsschwäche etc.

Inkontinenz – eine Volkskrankheit

Inkontinenz – eine Volkskrankheit

Jede 6.Frau über 60 ist betroffen!

Demographische Entwicklung

Bevölkerungspyramide 2009, 2030 und 2050
(mittlere Variante)

Q: STATISTIK AUSTRIA, Bevölkerungsprognose 2010. Erstellt am: 03.11.2010.

Quelle: Statistik Austria (2003), Bevölkerung Österreichs im 21. Jahrhundert, Wien S. 22-23.

Demographische Entwicklung

- **18% Zunahme > 75 Jahre**
- **38% Zunahme > 80 Jahre**

Q: STATISTIK AUSTRIA, Bevölkerungsprognose 2010. Erstellt am: 03.11.2010.

ders, Wien S. 22-23.

Urogynäkologische OPs

Olson 1995: Lifetime-Risk einer 80-Jährigen: 11%

Wilkins 2017: Lifetime-Risk einer 80-Jährigen: **20%**

- Sozioökonomischer Faktor!

Inkontinenz und Descensus – weit verbreitet aber oft verheimlicht!

Mögliche Gründe...

- Scham
- Gilt als normal bei älteren Menschen
- Verfügbarkeit von Absorbentien
- Geringe Therapieerwartungen
- Angst vor Operation
- Spärliche Kenntnisse über Behandlungsmöglichkeiten

Frauenarzt hat Schlüsselfunktion!

- Thematisieren
- Enttabuisieren
- Diagnostik
- Therapie

Diagnostik in der Urogynäkologie

- Anamnese und klinische Untersuchung
- Miktionsprotokoll/Miktionstagebuch
- Urinuntersuchung (K-Harn, Uricult)
- Restharnbestimmung
- Urodynamik
- Bildgebung
- Endoskopie

INKONTINENZ
NASS

Ziel

**ABHÄNGIGE
INKONTINENZ**
Trocken durch
Hilfsmittel bzw.
Therapie

**UNABHÄNGIGE
INKONTINENZ**
Trocken nach
Therapie

**SOZIALE
INKONTINENZ**
Durch Hilfsmittel
gesellschaftsfähig

Therapiemöglichkeiten

Kontinenz -Hilfsmittel

Ordens
klinikum
Linz

Barmherzige
Schwestern
Elisabethinen

Beckenboden
Zentrum

Medikamente

Beckenbodentraining

Ordens
klinikum
Linz

Barmherzige
Schwestern
Elisabethinen

Pessartherapie

2 Gruppen:

1. Stütz pessare (stützt sich am M. levator ab)
2. Füll pessare

Wann operieren?

- Konservative Therapie ausgeschöpft
- Harnverlust oder Senkung stört/belastet
- bei guter operativer Heilungschance
- Wenn Patientin Eingriff nach Aufklärung über Erfolgschancen und Risiken wünscht

Historie

Int Urogynecol J (1996) 7:81–86
© 1996 The International Urogynecology Journal

International
Urogynecology
Journal

20097

Original Article

An Ambulatory Surgical Procedure Under Local Anesthesia for Treatment of Female Urinary Incontinence

U. Ulmsten, L. Henriksson, P. Johnson and G. Varhos
Department of Obstetrics and Gynecology, Akademiska Sjukhuset, Uppsala University, Uppsala, Sweden

- 1996 Prof. Ulmsten TVT[®]
- TVT[®] geringer invasiv als bisheriger Goldstandard „Burch“ Kolposuspension, danach neuer Goldstandard
- **Langzeitstudienresultate: 11 Jahre (n= 90) zeigen:**
**90% objektive und
77% subj. Heilungsraten
20% verbessert**
(Nilsson, Falconer et al,
Int.Urogyn.J 2008; 8:1043-7)
- Um die Komplikationsraten zu reduzieren wurde TVT[®] klassisch weiterentwickelt

TVT – Tensionfree vaginal Tape

Das Prinzip von TVT

Kontinente Patientin

Inkontinente Patientin

Entwicklung

TVT "classic" 1996

- Durch den retropubischen Raum
 - Risiko der Blasenverletzung
- Ulmsten U et al
Uppsala, Schweden

Transobturator: TVT-O® 2001

- Durch die Membrana obturat.
 - Risiko Verletzung/Irritation obturat.Gefäß Nervenbündel, Adduktoren
- E. Delorme 2001
J.de Leval 2003, Liege Belgien

mini-slings: TVT-Secur® 2006

- eine Incision
- Fixierung im M. obturat. internus
- Vermeidung Penetration obturat.Gefäß Nervenbündel und Adduktoren

Entwicklung

Neu 2010: TVT –RL (exact)

- Durch den retropubischen Raum
- Risiko der Blasenverletzung

Neu 2010: TVT Abbrevio

- transoburatorisch

Entwicklung

Adjustierbare Schlingen

TVT Abbrevo®

Langzeiterfolg – 17 Jahre

C. Nilsson, C. Falconer et al

Long-Term Follow-Up of the TVT Operation: 17 Years

Seventeen years after the TVT operation 62 % (n=46) of the initial cohort could be assessed at the clinics according to the protocol. No women had adverse reactions or symptoms of the initially implanted tape material. In one women a small protrusion was noted. Of the assessed women

93 % were objectively cured. Subjectively 87 % of the women were cured or significantly better and **98 % would recommend** the operation to a friend....

79% claimed being dry on straining [...].

The TVT procedure proofs to be safe and effective for at least 17 years.

Tomaselli, 2015, Neapel

Int Urogynecol J (2015) 26:1253–1268
DOI 10.1007/s00193-015-2645-5

REVIEW ARTICLE

Medium-term and long-term outcomes following placement of midurethral slings for stress urinary incontinence: a systematic review and metaanalysis

Giovanni A. Tommaselli • Costantino Di Carlo •
Carmen Formisano • Annamaria Fabozzi •
Carmine Nappi

49 Studien

Fragen: Long Term Efficacy und Safety

Conclusio: RP-MUS und TO-MUS haben ähnliche objektive Heilungsraten. TOTs haben eine geringere subj. Heilungsrate als TVT

Bulking agents

- Polyacrylamid
- *Autologe Fettinjektion*

Bulking agents

- NICE-Guidelines: hohe Komplikationsraten – **nicht empfohlen**
- NICE/Cochrane: autologe Fettinjektion – **nicht empfohlen**

S2e-Leitlinie

- Fehlende Langzeitdaten
- Wiederholte Injektionen nötig, um langfristigen- manchmal auch nur kurzfristigen - Erfolg zu erzielen
- Weniger effektiv als andere operative Behandlungsmethoden
- *Möglicher Benefit: Patientenkollektiv mit eingeschränkter Operabilität*

Kolposuspension nach Burch

Ordens
klinikum
Linz

Barmherzige
Schwestern
Elisabethinen

Kolposuspension nach Burch

- Laparotomie/Laparoskopie
- 10-15% BES postoperativ
- Urge-Problematik

Indikationen für Burch:

- Wenn TVT nicht infrage kommen
- Bei gleichzeitiger Senkungsoperation
- bei LAP/LASK aus anderen Gründen
- *Lernkurve?*

Key-Points Operative Therapie

- Exakte urogynäkologische Anamnese und Untersuchung
- Ausschöpfen der konservativen Therapie vor Operation

S2e-Leitlinie Belastungsinkontinenz der Frau

Key-Points Operative Therapie

- 1. Wahl: Suburethrale Schlingen (retropubisch oder transobturatorisch)
 - Hypotone Urethra – retropubisch
 - Mischinkontinenz - transobturatorisch
- Kolposuspension nach Burch
 - Wenn Schlingen nicht infrage kommen
 - Bei gleichzeitiger Sanierung einer Traktionszystocele
 - Bei offenem /laparoskop. Zugang aus anderen Gründen
- Urethrozystoskopie bei jeder retropub. und schwierigen transobt. Schlinge
- Minischlingen: über fehlende Langzeitdaten aufklären
- Adjustierbare Schlingen nur im Rahmen von Studien

Danke!